

経緯

- 2009/3/18 初めてウイルスが確認される@メキシコ
2009/4 大流行@メキシコ
2009/4/25 感染者1000人超（内死者68人）@メキシコ
感染者8人@アメリカ
WHO緊急委員会
メキシコ市、公共活動停止を宣言
2009/4/26 感染者1320人（内死者81人）@メキシコ
感染者11人@アメリカ
メキシコからの帰国者がインフルエンザ陽性反応@NZ
アメリカ、緊急事態宣言
2009/4/27 感染者20人@アメリカ
感染者6人@カナダ
感染者1614人（内死者103人）@メキシコ
メキシコ発便の機内検疫実施@成田空港
感染者1人@スペイン
2009/4/28 WHO警戒レベルをフェーズ4に引き上げ
感染者44人@米国
感染者1995人（内死者149人）@メキシコ
感染者2人@英国
2009/4/29 アメリカで感染者死亡
2009/4/30 WHO警戒レベルをフェーズ5に引き上げ
2009/5/15 日本国内でインフルエンザA型陽性反応



公式発表による感染者数（死者数）の推移

[アーカイブ](#)

	2009/5/4	2009/5/5	2009/5/6
メキシコ	506(19)	590(25)	942(29)
アメリカ	233(1)	253(1)	642(2)
カナダ	85	101	165
スペイン	40	54	73
イギリス	18	18	28
ドイツ	8	8	9
ニュージーランド	4	6	5
イスラエル	3	4	4
イタリア	1	4	5
フランス	2	2	5
エルサルバドル		2	2
コロンビア	1	1	1
コスタリカ	1	1	1
韓国	1	1	2

スイス	1	1	1
香港	1	1	1
オーストリア	1	1	1
デンマーク	1	1	1
アイルランド	1	1	1
オランダ	1	1	1
ポルトガル		1	1
グアテマラ			1
スウェーデン			1
計	909(20)	1052(26)	1893(31)

症状

豚インフルエンザは通常の季節性インフルエンザに似た症状が出る。

発熱
倦怠（けんたい）感
食欲不振
せき
鼻水
吐き気
のどの痛み
下痢

などを発症する人もいる。

豚 人の感染の予防

豚インフルエンザウイルスは中心温度71度での調理で死滅。
このため調理した豚肉や加工品を食べて感染することはまずない。

人 人の感染の予防

[パンデミック対策](#)参照

感染したら

[パンデミック対策](#)参照